

Асқа биологиялық белсенді қоспаның атауы

Цицибон®

Құрамы

1 капсулада

Солтүстік американдық мүкжидектің құрғақ сығындысы -260 мг (ең аз стандартталғаны 7% ПАЦ-А (А тұрпатты проантоцианидин), аюбүлдірген жапырақтары құрғақ сығындысы - 90 мг (ең азы 20% арбутин), С дәрумені (аскорбин қышқылы) -37 мг, ортосифон жапырақтары құрғақ сығындысы - 37 мг.

көмекші заттар:

талық (толтырғыш), магний стеараты, кремний қос тотығы, магний тотығы (жентектелуді баялатқыш), пропилен метил целлюлоза гидрототығы (қабықшасы).

Қолданылу саласы,

Цицибон® зәр шығару жолдары инфекциялары қайталануының алдын алу, сондай-ақ несеп шығару жолдары инфекцияларын көшенді емдеу кезінде көмекші құрал ретінде қолданылады. Антибиотиктердің әсерін күшейтеді. Зәр шығаруды қалпына келтіруге жәрдемдеседі, созылмалы қуық қабынуының қайта асқынуы қаупін азайтады, бүйректер мен несеп жолдарының функционалдық күйін жақсартады.

Цицибон® құрамына енетін биологиялық белсенді заттар жиынтығы микробқа қарсы, қабынуға қарсы және зәр аяқтатылуға әсер етеді.

Қуық қабынуы кезінде Цицибон® жүйелі және ұзақ қолдану сирек асқынытын (созылмалы ауруларда) аса ұзақ әрі сапалы ремиссияға (сауығуға) қол жеткізуге септігін тигізеді немесе емделген жіті қуық қабынуы кезінде қайта ауруды болдырмайды.

Қасиеттері

Цицибон® құрамына енетін **мүкжидектің стандартталған сығындысы** солтүстік американдық қызыл мүкжидектен (Vaccinium Macrocarpon) алынады. Солтүстік американдық мүкжидекте А тұрпатты проантоцианидиндер немесе флавоноидтердің метаболизмі биосинтетикалық жолының белсенді олигомерлік түпкі өнімі болып табылатын ПАЦ-А шоғырланымы жоғары. Бірқатар ғылыми зерттеулер (Howell және тең авт., Phytochemistry журналы, 2005 жыл) нақ ПАЦ-А бактериалдық агенттерге қатысты антиадгезиялық белсенділігі болатынын көрсетті. Ол зәр шығару жолдарына төселетін эпителия жасушаларына бактериалардың адгезиясына (жабысуына) бөгет болады, бұл бактерияларға қуықтың қабырғаларына орнығуына мүмкіндік бермейді. Сондай-ақ бактериалдық қабықшаның зақымдануы жүреді, бұл қуықтың және зәр шығару жолдарының эпителиясының бетіндегі ауру туғызатын микроорганизмдердің көбеюіне кедергі келтіреді.

2004 жылы Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі жөніндегі француз агенттігі құрамында тек ПАЦ-А солтүстік американдық мүкжидектің 36 мг бар өнім ғана E.coli бактериаларының зәр шығару жолдары қабырғаларына адгезиялауын (жабысуын) азайту» мәселесі бойынша есепті бекітті. Цицибон® 2 капсуласында 7 % ПАЦ-А стандартталған 520 мг мүкжидек сығындысы болады, бұл ПАЦ-А36 мг сәйкес келеді.

С дәрумені жүктілік кезіндегі қуық қабынуы дамуының жиілігін азайтады, сонымен қатар ПАЦ-А-ның антиадгезивтік қасиетін күшейтеді. Цицибон® 2 капсуласында С дәруменінің 74 мг болады, бұл ұсынылған тәуліктік мөлшерлеменің 93% сәйкес келеді.

Аюжидек жапырақтарының құрғақ сығындысы айқын зәр айдағыш, қабынуға қарсы әрі микробқа қарсы әсер етеді. Аюжидектің фенолдық гликозидтері – арбутин мен метиларбутиннен арбутаз ферментінің әсерімен гидрохинон босап шығады. Зәрмен бірге бөлінген гидрохинон зәрдің бөлінуін күшейтеп, микробқа қарсы әсер етеді. Аюжидектің қабынуға қарсы қасиеттері дубильдік заттардың жоғары мөлшерде болуымен байланысты.

Ортосифон (яван шайы) шумақтап сүзгіленді артырады, бүйрек арналарының функциясын жақсартады, айқын байқалатын зәр айдағыш, калий үнемдеуші және қабынуға қарсы әсерге ие. Препараттың зәр айдау әсері науқастың ағзасынан бактериялардың тез шығуына жәрдемдеседі.

Қолдану тәсілі және ұсынылатын тәуліктік мөлшерлемесі

Ересектерге.

Күніне 1 мәрте 2 капсуладан, бір стакан сумен ішеді.

Зәр шығару ауырсынатын және зәр шығару кезінде зәр шығару жолдарын ашытатын зәр шығару жолдары инфекциялары кезінде Цицибон® кем дегенде 1 ай бойы қабылдаған жөн.

Егер зәр шығару жолдары инфекцияларын антибиотиктермен емдеу жүргізілсе, Цицибон® препаратын антибиотикпен емдеу курсы аяқталғаннан кейін ең аз дегенде тағы да 3 апта бойы қабылдаған жөн.

Қарсы көрсетілімдер

Препараттың құрамдастарына жеке ағзаның төзбеушілігі.

Цицибон® ұсынылатын мөлшерлемеден қабылдау жанама реакциялар туғызбайды.

Айрықша нұсқаулар

Асқа биологиялық қоспа дәрі-дәрмек болып табылмайды.

Ұсынылған мөлшерлемеден асырмаңыз.

Варфарин және бір мезгілде мүкжидек немесе оның шырынын қабылдап жүрген емделушілерге олардың қан кетудің пайда болу қаупімен бірге айтарлықтай ықтимал өзара әрекеттесуіне назар аударған жөн.

Сақтау шарттары

25°C-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Жарамдылық мерзімі: 3 жыл.

Жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін қолданбаңыз.

Шығарылатын түрі

Полиэтилен құтыдағы 30 өсімдік капсуласы (PE 2). Картон қаптамасындағы 1 құтыс (PAP 21).

Өндіруші

Plameca, Avenida Prat de la Riba s/n; 08780 Barcelona, Испания.

Сэлтфар ЛТД, Ұлыбритания үшін өндірілген (180 Tottenham Court Road, London, UK, W1T 7J)

Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның

мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы Сэлтфар ЛТД өкілдігі, Алматы қ-сы Аль-Фараби 5, Нұрлы Тау 1а, оф 301.

Тел./факс: +7 (727) 3111628