



**Инструкция для применения (листок-вкладыш)  
биологически активной добавки к пище  
Цицибон®**

**Наименование биологически активной добавки к пище**

Цицибон®

Состав

**В 1 капсуле содержится**

Сухой экстракт клюквы североамериканской -260 мг (стандартизованный мин. 7% ПАЦ-А (проантокинидин типа А), сухой экстракт листьев толокнянки -90 мг (мин. 20% арбутина), витамин С (аскорбиновая кислота) -37 мг, сухой экстракт листьев ортосифона - 37 мг.

**Вспомогательные вещества:**

тальк (наполнитель), стеарат магния, диоксид кремния, оксид магния (ингибитор комкования), гидроксид пропил метил цеплюлоза (оболочка).

**Область применения**

Цицибон® применяется для предупреждения рецидивов, а также в качестве вспомогательного средства при комплексной терапии инфекций мочевыводящих путей. Усиливает действие антибиотиков. Способствует нормализации мочеиспускания, уменьшает риск повторных обострений хронического цистита, улучшает функциональное состояние почек и мочевых путей.

Комплекс биологически активных веществ, входящих в состав Цицибон® оказывает противомикробное, противовоспалительное и диуретическое действие.

Систематическое и длительное применение Цицибон® при цистите позволяет добиваться более длительных и качественных ремиссий (выздоровлений) с редкими обострениями (при хроническом заболевании) или предотвратить повторное заболевание при излеченном остром цистите.

**Свойства**

**Стандартизованный экстракт клюквы**, входящий в состав Цицибон®, вырабатывается из североамериканской красной клюквы (*Vaccinium Macrocarpon*). Североамериканская клюква имеет высокую концентрацию проантокинидинов типа А или ПАЦ-А, которые являются активными олигомерными конечными продуктами биосинтетического пути метаболизма флавонOIDов. Ряд научных исследований (Howell и соавт., журнал *Phytochemistry* 2005 год) показал, что именно ПАЦ- А, обладает антиадгезивной активностью по отношению к бактериальным агентам. Он препятствует адгезии (прилипанию) бактерий к клеткам эпителия, выстилающим мочевыводящие пути, что не позволяет бактериям закрепляться на стенках мочевого пузыря. Также происходит повреждение бактериальной оболочки, что препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов на поверхности эпителия мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

В 2004 году Французское агентство по Безопасности пищевых продуктов, утвердило отчет по вопросу того, что только продукт, который содержит 36 мг ПАЦ-А североамериканской клюквы, может считаться продуктом, который «уменьшает адгезию (прилипание) бактерий *E.coli* к стенкам мочевыводящих путей». Две капсулы Цицибон® содержат 520 мг экстракта клюквы, стандартизованного в 7 % ПАЦ-А, что соответствует 36 мг ПАЦ-А.

Витамин С снижает частоту развития цистита во время беременности, а также усиливает антиадгезивные свойства ПАЦ-А. 2 капсулы Цицибон® содержат 74 мг витамина С, что соответствует 93% рекомендованной суточной дозы.

**Сухой экстракт листьев толокнянки** оказывает выраженный мочегонный, противовоспалительный и противомикробным эффекты. Из фенольных гликозидов толокнянки - арбутина и метиларбутина под действием фермента арбутазы высвобождается гидрохинон. Выделяясь с мочой, гидрохинон усиливает мочеотделение и оказывает противомикробное действие.

Противовоспалительные свойства толокнянки обусловлены высоким содержанием дубильных веществ.

**Ортосифон (янваник чай)** повышает клубочковую фильтрацию, улучшает функцию почечных канальцев, обладает ярко выраженным мочегонным, калийсберегающим и противовоспалительным действием. Мочегонный эффект препарата способствует быстрому выведению бактерий из организма больного.

**Способ применения и рекомендованная суточная доза**

Взрослым.

По 2 капсулы в 1 раз в день, запивая стаканом воды.

При инфекциях мочевыводящих путей с болезненным мочеиспусканием и жжением во время мочеиспускания, следует принимать Цицибон® в течение, по крайней мере, 1 месяца.

Если проводилось лечение инфекций мочевыводящих путей антибиотиками, следует принимать Цицибон® еще в течение, как минимум, 3 недель после завершения курса антибиотикотерапии.

**Противопоказания**

При индивидуальной непереносимости компонентов препарата.

Прием Цицибон® в рекомендуемых дозах не вызывает побочных реакций.

**Особые указания**

Биологически активная добавка к пище, не является лекарством.

Не превышайте рекомендованной дозы.

Пациентам, принимающим варфарин и одновременно продукты, содержащие клюкву или ее сок, следует обратить внимание на их потенциально возможное взаимодействие с риском возникновения кровотечения.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 3 года.

Не применять после завершения срока годности.

**Форма выпуска**

30 растительных капсул в полиэтиленовом флаконе (PE 2). 1 флакон в картонной упаковке (PAP 21).

**Производитель**

Plameca, Avenida Prat de la Riba s/n; 08780 Barcelona, Испания.

для Сэлтфар ЛТД, Великобритания (180 Tottenham Court Road, London, UK, W1T 7)

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции:

Представительство Сэлтфар ЛТД, в Республике Казахстан. г. Алматы, Аль-Фараби 5, Нурлы Тау 1а, оф 301.

Тел./факс: +7 (727) 311 16 28