

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

УТВЕРЖДЕНА  
Приказом Председателя  
РГУ «Комитет контроля качества и  
безопасности товаров и услуг  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан»  
от «13» марта 2020 г.  
№ N027432; № N027418

### Торговое наименование

ГЛИЦ<sup>®</sup>

### Международное непатентованное название

Глицерол

### Лекарственная форма, дозировка

Суппозитории ректальные, 1405 мг и 2100 мг

### Фармакотерапевтическая группа

Пищеварительный тракт и обмен веществ. Препараты для лечения запоров. Прочие слабительные. Глицерол

Код АТХ A06AX01

### Показания к применению

- симптоматическое лечение запоров.
- облегчение процесса дефекации после хирургических вмешательств или перед ректоскопией.

### Перечень сведений, необходимых до начала применения

#### Противопоказания

- повышенная чувствительность к глицерину или к любому вспомогательному компоненту препарата
- при кишечной непроходимости или обтурации.
- синдром раздраженного кишечника, тромбоз геморроидальных узлов, анальные трещины, геморрагический ректоколит
- детям до 18 лет нельзя применять ректальные суппозитории 2100 мг

#### Необходимые меры предосторожности при применении

Длительный прием не рекомендуется, так как это может вызвать диарею. Использование глицериновых суппозиториях для взрослых является лишь дополнительным средством комплексного гигиенически-диетического лечения. Для нормализации стула необходимо дополнять свой рацион клетчаткой и жидкостями, поддерживать физическую активность.

У детей младше 2 лет назначение суппозиториях 1405 мг должно производиться в исключительных случаях, поскольку оно может нарушать нормальное функционирование рефлекса дефекации. Перед и после применения суппозиториях следует тщательно вымыть руки.

#### Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не изучались.

#### Специальные предупреждения

Применение суппозиториях может помешать контролю за уровнем глюкозы у детей, больных диабетом. Если симптомы не проходят, проконсультируйтесь с врачом

#### Во время беременности или лактации

Следует избегать применения всех лекарственных препаратов, если это возможно, во время беременности и кормления грудью. Использовать только по назначению врача.

#### Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

ГЛИЦ<sup>®</sup> не влияет на способность управлять транспортным средством и потенциально опасными механизмами.

#### Рекомендации по применению

##### Режим дозирования

Обычная доза составляет 1 суппозиторий по мере необходимости.

При подготовке эндоскопического обследования прямой кишки:

- один суппозиторий за 5-30 минут перед исследованием.
- Детям с 2-х до 18 лет назначают ГЛИЦ<sup>®</sup>, ректальные суппозитории 1405 мг.
- Взрослым назначают ГЛИЦ<sup>®</sup>, ректальные суппозитории 2100 мг.

Чтобы облегчить введение, смочите суппозиторий прохладной водой.

#### Метод и путь введения

Применяют ректально.

#### Длительность лечения

Лечение запоров не должно превышать 10 дней.

#### Меры, которые необходимо принять в случае передозировки

О передозировке при применении ГЛИЦ<sup>®</sup> не сообщалось.

Случайный прием большого количества суппозиториях внутрь может вызвать головную боль, тошноту, рвоту, диарею, жажду, головокружение, спутанность сознания и нарушения сердечного ритма.

При приеме внутрь лечение симптоматическое.

#### Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

Обратитесь за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата

#### Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении лекарственного препарата и меры, которые следует принять в этом случае

Очень редко

- неприятные ощущения в области ануса
- воспаление при застойных процессах прямой кишки
- спастические боли в животе

При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов

РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг

Министерства здравоохранения Республики Казахстан

<http://www.ndda.kz>

#### Дополнительные сведения

##### Состав лекарственного препарата

Один суппозиторий содержит

активное вещество - глицерин 1405 мг или 2100 мг,

вспомогательные вещества: натрия стеарат, вода очищенная

##### Описание внешнего вида, запаха, вкуса

Бесцветные или полупрозрачные суппозитории в форме торпеды, с маслянистой, гладкой поверхностью, однородные по внешнему виду в месте разреза, со слабым характерным запахом

##### Форма выпуска и упаковка

По 6 суппозиториях помещают в контурную безъячейковую упаковку из фольги алюминиевой с полиэтиленовым покрытием.

По 2 контурные безъячейковые упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку картонную.

##### Срок хранения

3 года. Не применять по истечении срока годности!

##### Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте!

##### Условия отпуска из аптек

Без рецепта

##### Сведения о производителе

Antibiotice S.A., Romania

707410, г. Яссы, ул. Вали Лупулуй 1, Румыния, ЕС.

Тел.: +40 232 209 000; факс: +40 372 065 000, e-mail: [alin.irina@antibiotice.ro](mailto:alin.irina@antibiotice.ro)

##### Держатель регистрационного удостоверения

Сэлтфар ЛТД, Великобритания

Berkeley Square House, office 132, Лондон, Великобритания, W1J 6BD Тел/факс: +44(0)207 9691421. E-mail: [info@selftar.co.uk](mailto:info@selftar.co.uk)

Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства

Представительство «Сэлтфар ЛТД»

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ Нурлы Тау 1А, офис 301. Тел/факс +7 (727) 311 16 28. Адрес электронной почты: [info@selftarrep.kz](mailto:info@selftarrep.kz)