

**Тағамға биологиялық белсенді қоспаның атауы**

Цицибон® Форте

**Құрамы**

1 капсуланың құрамында:

Американдық мүкжидектің (жидек) (*Vaccinium macrocarpon*) құрғақ сығындысы (стандартталған мин. 50% ПАЦ) 300 мг, бұл 150 мг ПАЦ-қа сәйкес келеді, аюқұлақтың құрғақ сығындысы (*Arctostaphylos uva-ursi*) (мин. 20% арбутин), L-аскорбин қышқылы (C дәрумені), ортосифон құрғақ сығындысы (Ява шайының жапырақтары) (мин. 0,1% синенсетин).

**қосалқы заттар:** тальк-50 мг (толтырғыш), микрокристалдық целлюлоза - 20 мг; жентектеу баяулатқышы (магний оксиді) - 5 мг, аэросил 200 – 5 мг, магний стеараты - 5 мг).

**Қабықша:** өсімдік мөлдір капсулалар (гидроксипропилметилцеллюлоза) №0.

<b>ҰСЫНБАЛЫ ТҰТЫНУ:</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО на (2 КАПСУЛЫ):</b>
Американдық мүкжидек сығындысы (проантоцианидиндер құрамы)	600 мг (300 мг)
Аюқұлақ сығындысы (арбутин құрамы)	100 мг (20 мг)
C дәрумені	59,2 мг (74% ТАД*/ЖҚД)
Ортосифон құрамы (Ява шайы) (синенсетин құрамы)	74 мг (74 мкг)

**Қолдану аясы**

Цицибон® Форте несең шығару жүйесінің функционалдық күйін жақсартуға арналған проантоцианидиндердің және C дәруменінің қосымша көзі ретінде көрсетілген.

Цицибон® Форте – бұл жұмсақ капсула өнімі. Проантоцианид құрамына стандартталған (ПАЦ) ірі мүкжидек (*Vaccinium macrocarpon*) сығындысымен (25: 1) оңтайлы сәйкестендірілген композиция.

Цицибон® Форте несең шығару жолдарының функциялары бұзылған кезде қолдануға ұсынылады. Мүкжидек адамның денсаулығына оң әсер ететін дәрумендердің, биофлавоноидтердің, фенол қоспаларының және басқа да табиғи заттардың бай көзі болып табылады. Мүкжидек сығындысы қуық қабырғасына және уретраға төселген жасушаларда ауру тудырғыш микроағзалардың көбеюіне кедергі келтіреді (ең бастысы *Escherichia Coli* – 85% жағдайларда несең шығару инфекцияларының себептері).

Цицибон® Форте қолдануды антибиотиктермен үйлестіруге болады. Цицибон® Форте күнделікті тұтыну несең шығару жолдарының қайталама ауруларынан қорғауды және несең шығару жүйесінің сау күйін сақтауды қамтамасыз етеді.

**Қасиеттер**

**Мүкжидектің стандартталған сығындысы** проантоцианидиндердің немесе ПАЦ жоғары концентрациясы бар солтүстік америкалық қызыл мүкжидектен шығарылады (*Vaccinium Macrocarpon*). Бірқатар ғылыми зерттеулер (Howell және авторлас., *Phytochemistry* журналы, 2005 жыл) бактериялық агенттерге қатысты дәл ПАЦ-тың белсенділікке ие болатынын көрсетті. Ол бактериялардың несең шығару жолдарына төселген эпителий жасушаларына жабысуына кедергі келтіреді, ал бұл бактерияларға қуықтың қабырғаларына бекітуге мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар бактериялық қабықшаның зақымдануы орын алады, ал бұл несең-жыныс жүйесі эпителийінің бетінде ауру тудырғыш микроағзалардың көбеюіне кедергі келтіреді.

Цицибон® Форте тиімділігі сығындылардың жоғары концентрациясымен түсіндіріледі. Цицибон Форте 2 капсуласы 300 мг ПАЦ-қа сәйкес келеді. **C дәрумені** әйелдерде циститтің даму жиілігін төмендетеді, сонымен қатар ПАЦ қасиеттерін күшейтеді.

**Аюқұлақ жапырақтарының құрғақ сығындысы**

Аюқұлақ жапырақтары құрамында бірқатар флавоноидтар және органикалық қышқылдар бар, бірақ аюқұлақты пайдалану негізгі әсер несең-жыныстық жүйеде қаныну процесінің болған кезде несең айдағыш әсер етуді күшейтуге себептесетін глюкозид арбутиннің болуымен шартталған.

**Ортосифон (ява шайы)** жағымсыз ауырсыну түйсіктерінен, ашып ауырудан арылтуға және несең шығару кезінде несеңтің шығуын жеңілдетуге көмектеседі.

**Қолдану тәсілі**

Ересектерге, тамақ ішкен кезде бір стакан сумен күніне 2 рет 1 капсуладан, төңертең біреу және түнге біреу.

Цицибон® Форте кемінде 1 ай бойы қабылдану қажет.

Егер несең шығару жолдарының инфекцияларын антибиотиктермен емдеу жүргізілсе, антибиотикотерапия курсы аяқталған соң Цицибон® Форте кем дегенде тағы 3 апта бойы қабылдану қажет.

Несең шығару жүйесінің таралыны жылына 3 рет және одан да көп қайталанатын бұзылыстар кезінде Цицибон® Форте үш ай бойы, әр айда екі апта бойы, түнге 1 капсуладан қабылдану қажет.

Ауа-райының маусымдық өзгерістерінің, ылғалды/ыстық ауа-райының, стрестің, асқаттардың, нашар гигиена жағдайларының несең шығару жолдарының таралыны өзгерістерді тудыруы мүмкін екені расталды. Оларды өсектеу үшін әйелдер қолайсыз факторлардың бүкіл әсер етуі кезінде Цицибон® Форте қабылдауы мүмкін.

**Қарсы көрсеткіштер**

КҮТ компоненттерінің жеке көтере алмаушылығы кезінде.

Құрамында аюқұлақ болғандықтан жүктілік және емшекпен емізу кезінде қолдану ұсынылмайды.

Цицибон® Форте ұсынбалы мөлшерлемелерде қабылдау жанама реакцияларды тудырмайды.

**Ерекше нұсқаулар**

Тағамға биологиялық белсенді қоспа, дәрі болып қабылданмайды.

Ұсынылған мөлшерлемені асырмаңыз.

Варфаринді және бірмезетте мүкжидекті немесе оның шырынын қабылдайтын емделушілерге қан ағудың пайда болу қаупімен олардың әлеуетті ықтималды өзара әрекеттесуіне назар аудару қажет.

**Сақтау шарттары**

+25°C-тан аспайтын температура кезінде сақтау керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**Жарамдылық мерзімі:** 3 жыл. Жарамдылық мерзімі аяқталған соң қолданбаңыз.

**Шығару нысаны**

Полиэтилен флаконында (PE 2) 30 өсімдік капсула. Картонды қаптамада 1 флакон (PAP 21).

**Өндіруші**

PLAMECA.

Avenida Prat de la Riba s/n; 08780 Barcelona, Испания

«Сэлтдр ЛТД», Ұлыбритания үшін өндірілді (Berkeley Square House, office 132, London, United Kingdom, W1J 6BD)

Қазақстан Республикасының аумағында өнімнің сапасы бойынша тұтынушылардан шағымдарды қабылдайтын ұйымның мекенжайы: Қазақстан Республикасында «Сэлтдр ЛТД» өкілдігі. Алматы қ., Әл-Фараби, 5, Нұрлы Тау, 1а, 301-кеңсе. Тел: +7 (727) 311 16 28.